今後の治療方針を考えます。

改善に向けて一緒に頑張って行きましょう☆★

必ず最後まで服用して下さい。

症状がなければ治っている可能性は高いのですが、

薬は途中で止めずに

お薬がなくなる頃に必ず受診して下さい。

簡単な聴力検査をして

くさのクロ 新

突発性難聴

突発性難聴とは、

ある日突然、 難聴が起きる原因不明の病気です。



約90%の方に耳鳴り、 約60%の方に耳が詰まった感じ(耳閉感)を伴い、

あれば、メニエール病という内耳の慢性的な病気となります。 約 **30** とです。) を伴う突発性難聴と、 %の方にめまいを伴います。(もし今後も、難聴やめまいを繰り返すようで ②メニエール病発作の1回目は区別がつかないと言うこ つまり、 ①めまい

発症早期から一生懸命に治療をしても治らないことがあります。 突発性難聴は、 何も治療しなくても、 自然と治ることもあります

ですが、 残念ですが初期時に治るか治らないかを予測することは出来ません。 頑張って治療しましょう♪ 早期に治療を開始することで治る確率が上がりますので、

らいまでです。ですので、発症後3ヵ月経過してしまった場合改善が困難です。 回復の期待が出来るのは、 発症後だいたい1ヵ月、 あるいはせいぜい2ヵ月く

今月 6/1 (月) よりスギ花粉症の新しい 治療法「舌下免疫療法」が開始されまし 賀新聞などのメデ \ます! 今年は 11/30 ま お気軽にお声掛けくださ

急性中耳炎、 急性副鼻腔炎 急性咽頭喉頭炎

と診断された方は医師の許可が出

るまでプールは避けましょう☆

くさの日鼻咽喉科

〒843 - 0001

武雄市朝日町大字甘久 1287(メリーランド武雄内)

制作者:東島ひ、福母

アデノウイルスが原因となります。 咽頭結膜熱

夏風邪のひとつで、 プール熱とも言われ

主な症状は、結膜炎、 咽頭痛、 発熱です。

下がったりが4~5日ほど続き、 1日の間に39~4℃の高熱と、 37〜38℃前後の微熱の間 喉の痛みが現れます。 を、 上がったり

なったりします。 また、結膜炎に伴って充血、 目の痛み、痒み、目やに、 涙がとまらなく

これからプールに入ることが増えると思いますが、手洗い・うがいなどを 潜伏期間は5~7日間で、症状がなくなってから2日間は登校禁止となります。 このほかにも、 予防方法は手洗い・指手消毒や、うがい、身の回りの消毒を行うことです! 腹痛、 下痢、 咳を伴うこともあります。

徹底して咽頭結膜熱にかからないよう、気をつけましょう!

国立感染症研究所HPなどより

今月の豆知識

今月のニュース